

Agrion nicaeensis de Risso

Deliry C. 2019 - *Agrion nicaeensis* de Risso (Odonata : Calopterygidae). - *Nomina Odonata*, 20 janvier 2019.

Agrion nicaeensis Risso, 1826 corresponds à *Calopteryx virgo*. Ce taxon méridional corresponds même à *Calopteryx virgo meridionalis* si bien qu'en définitive nous devrions avoir plutôt *Calopteryx virgo nicaeensis* (Risso, 1826) pour désigner cette sous-espèce.

La synonymie est [confirmée par l'INPN \(2019\)](#), par contre Hämäläinen (2016) l'attribue étrangement à *Calopteryx virgo virgo* (hic 2019).



©© bync - Yann29Sama - France, Charentes-Maritime le 15 août 2015 - Monde des Insectes

Hämäläinen M. 2016 - *Calopterygoidea of the World*. - Chez l'auteur, Espoo, Finlande.

Risso J.A. 1826 - *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes*. - Levrault, Paris et Strasbourg : 403 pp.

IV^e FAMILLE. — LES AGRIONIDES.

<i>Agrion puella</i> , FAB. , ¹	<i>Agrion demoiselle</i> .
— <i>azurea</i> , LEACH ,	— azurée.
— <i>rubescens</i> , LEACH ,	— rougeâtre.
— <i>virgo</i> , FAB. ,	— vierge.
— <i>nicæensis</i> , L.-R. ,	— de Nice.

Thorace abdomineque purpureo-violaceis, viride azureoque commixtis pictis; alis brunneo viridescente nigris, basi hyalinis; pedibus nigris.

Corselet et ventre d'une couleur mélangée de teintes vertes, azur et pourpre violet; ailes d'un noir brun verdâtre, à base transparente; pieds noirs. Long. 0,060. Séj. Tous nos endroits humides. App. Mai, novembre.

Cette sous-espèce en France, remonte jusqu'en Normandie à l'ouest, dans l'Ain à l'est et se trouve en Corse.