

Calopteryx splendens (Harris, 1780)

Caloptéryx éclatant

Libellula virgo Linnaeus, 1758 (partim), Libellula splendens Harris, 1780, Libellula ludovicea Geoffroy in de Fourcroy, 1785, Calepteryx ludovicia Samouelle, 1819 (nomen nudum), Calepteryx ludoviciana Leach in Stephens, 1829 (nomen nudum), Agrio cellaris Selys in Meisser, 1831, Agrio virescens Selys in Meisser, 1831, Calepteryx xanthostoma Stephens, 1835 (nec de Charpentier, 1825), Calopteryx parthenias de Charpentier in Burmeister, 1839, Calopteryx splendens race ancilla Hagen in Selys, 1853, Calopteryx splendens race taurica Selys, 1853, Calopteryx splendens mingrellica Selys, 1869, Calopteryx splendens intermedia Selys, 1887, Calopteryx splendens tuempeli Scholtz, 1908, Calopteryx splendens tschaldririca Bartenev, 1909, Calopteryx splendens cretensis Pongracz, 1911, Calopteryx intermedia persica Bartenev, 1912, Calopteryx intermedia cecilia Bartenev, 1912, Calopteryx amasina Bartenev, 1912, Calopteryx splendens ciscaucasica Bartenev, 1925, Calopteryx splendens balcanica Fudakowski, 1930, Calopteryx splendens cartvelica Bartenev, 1930, Agrion splendens erevanense Akramowski, 1948, Calopteryx splendens johanseni Belyshev, 1955, Calopteryx splendens pseudosyriaca Buchholz, 1955, Calopteryx splendens caprai Conci in Conci & Nielsen, 1956, Calopteryx splendens waterstoni Schneider, 1984, Calopteryx splendens njuja Kosterin & Sivtseva, 2009

Non menacée - LC 2009

- Calopteryx splendens splendens (Harris, 1780)
- Calopteryx splendens amasina Bartenev, 1912
- Calopteryx splendens ancilla Hagen in Selys, 1853 - Est de l'Europe et ouest de l'Asie.
- Calopteryx splendens balcanica Fudakowski, 1930
- Calopteryx splendens caprai Conci in Conci & Nielsen, 1956
- Calopteryx splendens cretensis Pongracz, 1911 - Crète. - Semble être une bonne espèce (hic 2004).
- Calopteryx splendens intermedia Selys, 1887
- Calopteryx splendens mingrellica Selys, 1869
- Calopteryx splendens njuja Kosterin & Sivtseva, 2009

- *Calopteryx splendens taurica* Selys, 1853
- *Calopteryx splendens tschaldirica* Bartenev, 1909
- *Calopteryx splendens waterstoni* Schneidre, 1984

Angleterre (ill. Muffet 1589-90).

Depuis l'Europe, France, à l'Asie centrale, voire jusqu'à proximité de la Chine. En expansion localement. Généralement sous 800 m d'altitude en Europe centrale, mais égarée jusqu'à 1850 m dans les Hautes-Alpes. Ruisseaux et rivières tempérées, eaux stagnantes avec circulations phréatiques. Vole d'avril à octobre dans le sud, de mai à septembre dans le nord. Développement larvaire en un à deux ans. Le couple entreprends avant l'accouplement un vol nuptial complexe. Les mâles se rassemblent en dortoirs nocturnes, alors que les femelles restent dispersées en général (Deliry 2017).



©© byncsa - Cyrille Deliry - France, Ain le 24 mai 2015 - Histoires Naturelles

Deliry C. 2017 - Odonata Europaea. - Histoires Naturelles, 49.

Harris M. 1780 – An exposition of English insects. – White & Robson, London.

Öntürk T. & Arslan N. 2018 - *Calopteryx splendens intermedia* Sélys, 1887 (Insecta-Odonata-Zygoptera) Larvae Nutrition and Behaviour. - Intern. J. of Environ. Research and Technology, 1 (2) : 35-36.

Muffet T. 1589-1590 - *Insectorum sive Minimorum Animalium Theatrum*. - Réed. 1634 - Londini.

Raillot M.C. 2017 - Présence de *Calopteryx splendens caprai* Conci, 1956 dans les Alpes françaises, erratisme ou indigénat ? - Grenha, inventaire 2017.