



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Annali del Museo civico di storia naturale di Genova.

Genova :Tip. del R. Istituto Sordo-Muti,1870-1914.

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/7929>

ser.2:v.30 (1890-1891):

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/95300>

Page(s): Page 476, Page 477

Holding Institution: Smithsonian Libraries

Sponsored by: Smithsonian

Generated 26 January 2019 7:18 PM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/088688100095300>

This page intentionally left blank.

supérieurs, dont le bout est en forme de corne recourbée. Les deux nervules de l'espace médian des ailes supérieures sont un bon caractère distinctif qui n'existe pas chez les autres espèces et que le D.^r Hagen avait bien remarqué dans l'exemplaire dont il avait bien voulu m'adresser la description.

Cet exemplaire provenait de Ceylan.

45. **Leptogomphus Gestroi**, Selys, n. sp.

Abdomen ♂ 40-42; ♀ 39. Aile inférieure ♂ 34-35; ♀ 35.

♂. Ailes hyalines à réticulation noire. Ptérostigma médiocre (long de 2 à 3 $\frac{1}{2}$ mm) brun obscur entre deux nervures noires épaisses, surmontant 3-4 cellules; 15-16 antécubitales et 11 postcubitales aux supérieures. Triangle des inférieures plus long. Le bord anal excavé après le triangle anal qui est de 3 cellules. Une nervule basale sous-costale aux quatre ailes.

Tête blanc jaunâtre marqué de noirâtre ainsi qu'il suit: la lame occipitale (qui est un peu relevée de côté, légèrement émarginée au milieu); le vertex excepté un point central pâle; les sutures de la face; le rhinarium; un large bord antérieur à la lèvre supérieure qui est presque traversée par un trait médian obscur.

Prothorax noirâtre taché de jaune; le bord postérieur jaune, en feston long émarginé au milieu, mais ses pointes latérales noirâtres.

Thorax noirâtre en avant jusqu'à la suture humérale, avec un demi-collier mésothoracique court et de chaque côté une bande antéhumérale jaunâtre droite ne touchant ni le demi-collier ni les sinus, puis une raie juxtahumérale de même couleur. Les côtés et la poitrine jaunâtre pâle avec trois bandes noirâtres, la première juxtahumérale épaisse, la seconde à la suture médiane, l'une et l'autre ne touchant pas les pieds; la troisième réduite à un vestige supérieur irrégulier à la dernière suture.

Abdomen long, grêle, un peu épaissi à la base, s'élargissant successivement aux 8-10.^{me} segments; le dernier très mobile, susceptible de se pencher complètement en bas, à bord basal

divisé profondément en deux festons. L'abdomen est noirâtre marqué de jaunâtre ainsi qu'il suit: une petite tache basale et les côtés au 1.^{er} segment; une bande dorsale trilobée et les oreillettes au 2.^{me}; une raie dorsale aux 3-7.^{me}, cette raie est interrompue par le noir des articulations et ne touche pas le bout de chaque segment.

Appendices anals supérieurs blanc jaunâtre, de la longueur du dernier segment, écartés, parallèles subtriangulaires larges à la base qui forme à leur premier quart une forte dent conique externe inclinée en bas; le reste de leur bord portant en dessous, extérieurement, une dizaine de petites dents noires jusqu'à la pointe qui est aigue, légèrement redressée. Appendice inférieur brun clair, un peu plus court que les supérieurs, largement échancré à angle obtus dans la moitié de sa longueur les deux branches formant la fourche épaisses, non divariquées, mais complètement redressées, leur extrémité mousse, noirâtre. Hameçons du 2.^{me} segment saillants.

Pieds courts noirâtres, l'intérieur des premiers femurs et les trois quarts de ceux de la troisième paire livides, ces derniers (longs de $6\frac{1}{2}$ ^{mm}) munis d'épines rudimentaires nombreuses très-courtes.

♀. Colorée comme le mâle. Chez l'exemplaire unique recueilli, la coloration des parties claires est d'un jaune plus pur, la lame de l'occiput porte au centre une large échancrure arrondie jaunâtre, terminée de chaque côté par une forte dent conique obscure.

Appendices anals de la longueur du 10.^{me} segment, jaunes, subcylindriques pointus, écartés par une protubérance arrondie jaune qui termine l'abdomen.

Ecaille vulvaire large à la base, effilée ensuite, divisée dans sa seconde moitié en deux lamelles légèrement écartées, atteignant le bout du 9.^{me} segment.

Patrie: Leito, à la fin de mai (Fea).

Dédiée au savant Docteur Gestro, conservateur du Musée Civique de Gênes.