

## II. HEMIPTERA.

195. CICADA *Rostrum* inflexum. *Pedes* postici saltatorii.  
 196. NOTONECTA *Rostrum* inflexum. *Pedes* postici natatorii  
 (ciliati.)  
 197. NEPA *Rostrum* inflexum. *Pedes* antici capitis cheliferi.  
 198. CIMEX *Rostrum* inflexum. *Pedes* cursorii.  
 199. APHIS *Rostrum* inflexum. *Abdomen* bicornè.  
 200. CHERMES *Rostrum* pectorale. *Pedes* postici saltatorii.  
 201. COCCUS *Rostrum* pectorale. *Abdomen* postice setosum ma-  
 ribus.  
 202. THIRIPS *Rostrum* obsoletum. *Alæ* incumbentes abdomini re-  
 flexili.

## III. LEPIDOPTERA.

203. PAPILIO *Antennæ* extrorsum crassiores. *Alæ* erectæ.  
 204. SPHINX *Antennæ* medio crassiores.  
 205. PHALÆNA *Antennæ* introrsum crassiores.

## IV. NEUROPTERA.

206. LIBELLA *Cauda* forcipata. *Os* maxillosum. *Alæ* extensæ.  
 207. EPHEMERA *Cauda* setis 2 s. 3. *Os* edentulum. *Alæ* erectæ.  
 208. PHRYGANEA *Cauda* simplex. *Os* edentulum. *Alæ* deflexæ.  
 209. HEMEROBIUS *Cauda* simplex. *Os* bidentatum. *Alæ* deflexæ.  
 210. PANORPA *Cauda* chelata. *Os* rostratum. *Alæ* incumbentes.  
 211. RAPHDIA *Cauda* filo 1. *Os* bidentatum. *Alæ* deflexæ.

## V. HYMENOPTERA.

212. CYNIPS *Aculeus* spiralis!  
 213. TENTHREDO *Aculeus* ferratus! bivalvis.  
 214. ICHNEUMON *Aculeus* exsertus! triplex.  
 215. SPHEX *Aculeus* punctorius. *Alæ* planæ. *Os* elingue.  
 216. VESPA *Aculeus* punctorius. *Alæ* superiores plicatæ!  
 217. APIS *Aculeus* punctorius. *Lingua* inflexa!  
 218. FORMICA *Aculeus* obsoletus. *Alæ* neutris nullæ!  
 219. MUTELLA *Aculeus* punctorius. *Alæ* omnibus nullæ!

## IV. NEUROPTERA.

Alæ IV nudæ, venis reticulatæ.

Cauda sæpius aliquo sexus adminiculo instructa, inermis.

207. LIBELLULA. Os maxillosum: maxillis pluribus.

Antennæ thorace breviores.

Alæ extensæ.

Cauda particulis hamofo-foliaceis.

\* Alis patentibus acquiescentes.

4-macu- 1. L. alis posticis basi omnibusque medio antico macula  
lata. nigricante.

*Fn. suec.* 764. L. alis macula marginali duplici.

*Raj. inf.* 49. n. 3.

*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 1, 2.

*Habitat in Europa.*

flaveola. 2. L. alis basi luteis. *Fn. suec.* 765.

*Raj. inf.* 49. n. 4.

*Rœf. inf.* 2. aqu. 2. t. 5. f. 4.

*Habitat in Europa.*

*Hæc inter minores; variat rarius alis absque basi lutea; forte sexu.*

vulgata. 3. L. alis albis, corpore fusco; cauda simplici. *Faun.*  
*suec.* 766.

*Raj. inf.* 49. n. 6.

*Rœf. inf.* 2. aqu. 2. t. 8.

*Habitat in Europa.*

rubicun- 4. L. alis tantum posticis basi nigricantibus.  
da.

*Rœf. inf.* 2. aqu. 2. t. 7. f. 4.

*Raj. inf.* 50. n. 8.

*Habi-*

---

Libellulæ Accipitres gymnopterorum Larvis intra aquam currunt, Fera crudeles insectorum aquaticorum; Illarum patentes Lepidoptera, ersitæ Diptera imprimis prædantur.

*Habitat in Europa.*

*Sexus alter a tergo thoracis & abdominis maculis rubris; alter luteis.*

depressa. 5. L. alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine depresso-lanceolato lateribus flavescente.

*Raj. inf. 140. & 49. n. 4, 5. Reaum. inf. 6. t. 35. f. 1.*

*Rœs. inf. 2. aqu. t. 6. f. 4.*

*t. 7. f. 3.*

*Habitat in Europa.*

*Hæc interdum abdominis tergo cærulescente occurrit.*

vulgatis- 6. L. thorace strigis octo flavicantibus.

*fina. Fn. svec. 767.*

*Swamm. quart. t. 8. f. 6. Rœs. aquat. 2. t. 5. f. 3.*

*Habitat in Europa.*

cancellata. 7. L. alis basi immaculatis, abdomine dorso lateribusque interrupte luteis.

*Habitat in Europa.*

ænea. 8. L. thorace æneo-viridi.

*Fn. svec. 768, 769. L. thorace viridi nitido lineis flavis.*

*Raj. inf. 49. n. 5. & 140.*

*Rœs. inf. 2. aqu. 2. t. 5. f. 2.*

*Habitat in Europa.*

grandis. 9. L. alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor flavis.

*Fn. svec. 770.*

*Mouff. inf. 67. n. 2. 3.*

*Raj. inf. 49. n. 2. & 140. n. 2.*

*Reaum. inf. 6. t. 38. f. 3.*

*Rœs. inf. 2. aqu. 2. t. 4. f. 14.*

*Habitat in Europa.*

juncea. 10. L. alarum membranula accessoria nigricante, thorace lineis sex flavis, abdomine ad basin attenuato.

*Habitat in Europa.*

*Alarum posticarum membranula baseos nigricans in hæc specie, at in antecedenti alba.*

11. L.

*Libellula Mas, visa sociâ, ut eam devirginet, caudâ forcipe apprehendit femine col- lum, quo vero illa, vinci nōlens volensve, liberetur, caudâ suâ vulvisera re- pellit proci pectus, ubi maris arma latent; sic unitis sexibus obvolitat pro- pria lege.*

- forcipata. 11. L. thorace nigro characteribus variis flavescens.  
*Fn. suec.* 771.  
*Pet. mus.* 84. n. 819.  
*Reaum. inf.* 4. t. 10. f. 4.  
                   6. t. 35. f. 5.  
*Habitat in Europa.*
- fasciata. 12. L. alis planis fuscis: fascia alba lineari.  
*Edw. av.* 174. t. 174.  
*Habitat in India. De Geer.*
- umbrata. 13. L. alis planis albis: fascia fusca.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Alarum fascia in medio; apices alarum obscuriores.*
- dimidiata. 14. L. alis planis a basi ad medium nigris.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Margo alarum etiam fuscus est, ceterum hyalinae. Cauda duobus parvis mucronibus.*
- chinensis. 15. L. alis superioribus testaceo-obsoletis; secundariis viridibus apice fuscis.  
*Edw. av.* 112. t. 112.  
*Habitat in China.*
- americana. 16. L. alis purpurascens: fascia alba, primoribus apice albis; posticis linea basalis alba.  
*Edw. av.* 174. t. 174.  
*Habitat in America.*  
*Corpus viride. Alae fusco-purpurascens.*
- \* \* *Oculi distantes remotique.*
- Virgo. 17. L. alis erectis coloratis.  
 α. Libellula corpore sericeo nitido, alis luteo-fuscis margine immaculatis. *Fn. suec.* 756.  
*Roes. aqu.* 2. t. 9. f. 7.  
*Raj. inf.* 50. n. 11.  
 β. Libellula corpore sericeo nitido, alis viridi-caeruleis apice fuscis: margine immaculatis. *Faus. suec.* 757.  
*Raj. inf.* 50. n. 10.  
*Homburg. Act. Paris.* 3. p. 145.  
*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 7.

γ. Libellula corpore viridi-cæruleo, alis subfuscis : puncto marginali albo. *Fn. suec.* 758.

*Rœs. aqu.* 2. t. 9. f. 6.

*Raj. inf.* 51. n. 12.

δ. Libellula corpore sericeo nitido, alis inaurato-fuscis : macula nigra. *Fn. suec.* 759.

*Rœs. aqu.* 2. t. 9. f. 5.

*Raj. inf.* 50. n. 9. & p. 140. n. 2.

*Habitat in Europæ fluviis.*

Puella. 18. L. alis erectis hyalinis.

α. Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali fusco.

*Fn. suec.* 760.

*Raj. inf.* 51. n. 15.

*Rœs. aqu.* 2. t. 10, 11. omnes.

*Reaum. inf.* 6. t. 40. f. omnes.

β. Libellula corpore incarnato, alis puncto marginali fusco. *Fn. suec.* 761.

*Raj. inf.* 51. n. 16. & 52. n. 17.

*Reaum. inf.* 6. t. 3. f. 4. & t. 4. t. 11. f. 6.

*Rœs. inf. aqu.* 2. t. 10, 11.

γ. Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali nigro.

*Fn. suec.* 762.

*Raj. inf.* 140. n. 1.

δ. Libellula corpore cæruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro. *Fn. suec.* 763.

*Gœd. inf.* 3. p. 29. f. R. *Merian. eur.* 78. t. 156.

*List. gœd.* 228. f. 103. *Raj. inf.* 53. n. 18.

*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 6. *Frisch. insect.* 8. t. 11.

*Habitat ad prata paludosa, victitans Muscis.*

*Varietates conjunxi, quas copula sæpius junctas vidi.*

208. EPHEMERA. Os edentulum absque palpis.

Alæ erectæ : posticis minimis.

Cauda sæpius setosa.

\* *Cauda trifeta.*

vulgata. 1. E. cauda trifeta, alis nebuloso-maculatis. *Faun. suec.* 750.

*Habitat in Europæ aquis.*

\*\* *Cau-*

Ephemere Larvæ natant in Aquis; volatiles factæ brevissimo fruuntur gaudio, sub quo copulentur & pariant.