

► RAY, John, 1710. *Historia insectorum [en ligne]*. Londini: Impensis A. & J. Churchill.

Print

# HISTORIA INSECTORUM.

*Ray*  
AUTORE JOANNE RAI<sup>O</sup>,

Collegii S. TRINITATIS apud Cantabrigienses, &  
SOCIETATIS REGIÆ olim Socio.

OPUS POSTHUMUM  
Jussu REGIÆ SOCIETATIS LONDINENSIS  
Editum.

---

Cui subjungitur APPENDIX de Scarabæis BRITANNICIS,  
Autore M. LISTER S. R. S. ex MSS. Musæi  
ASHMOLÆANI.

---

---

LONDINI:

Impensis A. & J. CHURCHILL, ad insigne Nigri Cycni  
in vico dicto Pater-noster-row. M.DCC.X.

- RAY, John, 1710. *Historia insectorum [en ligne]*. Londini: Impensis A. & J. Churchill.

*De Libellis, Perlis Italis dictis, Anglis Dragon-flies & Adder-bolts.*

Mnes quatuor alas membranaceas habent : Oculos magnos reticulatos, totum ferè caput occupantes. Volatus majorum pernix ad muscas capiendas, & ad aerem à molestis animalculis purgandum. Hoc sane (inquit Swammerdamius) mirum est ; longè tamen magis mirum, omnémque captum humanum superans earundem coitus. Mafculus enim dum per aerem pervolans, in eodem libratus, innumeros pingit horsum & illorsum ludibundos mæandros, atque eundem centum gyris diffindit, ineffabili dexteritate novit, qui suæ foemellæ caudam porrigat : quam illa inter oculorum capitisque confinia receptam pediculis suis igneo amore tenerrimè circumpletebitur, & benevolentia maritali blandiens, circumflectit naturalia sua, sita in extrema cauda, ad mariti sui virilia, in medio abdome prominula, rorem genitalem depluentia.

In

In descriptione coitūs hujus Insecti, cum Swammerdamio consentit D. Will. qui & ipse eum curiosè observavit, & descripsit in Hist. Insect. MS.

Prodeunt autem Libellæ ex Insectis hexapod. Mouffeti Theat. Insect. p. 322. pro pulicibus marinis depictis, & pag. præced. pro Locustis aquaticis.

Scorpius etiam aquaticus Redi nihil aliud est quām itidem Libellæ nymphæ, sed ejas speciei quam inter virgunculas majores recenseremus. Swammerdam. F. W. Existimat insuper D. Willughby duplicem esse Libellarum ortum: unum ex hexapod. aquaticis tripilibus, caudis pinnatis, quarum species aliquot describit; alterum ex hexapod. figuræ brevioris latioris, & pinnis istis carentibus, quæ in Libellas majores breviores mutantur.

Hexapodem unde exeunt primi generis Libellæ, in hunc modum describit. Hexapus tripilis, coloris fusci. Caput, oculi, os Libellarum similia. Antennæ ei duæ, breves, directè antrorsum protensæ. Pedes prælongi, pallidè lutescentes, maculis nigris varii, quorum nulli supra dorsum reflectuntur, ut in aliis, nec natando corpus sursum & deorsum movent, sed lateraliter piscium more. Cauda tres latiores pinnas gerit, ordine triangulari sitas, quæ extra aquas unam latam caudam efficiunt, ut in piscibus perpendicularē non transversam. Pinnæ caudæ fusco & albo variantur. Corpore est rotundo (in quo alarum primordia apparent) in 8 velut angulos distincto, areis nigrioribus & magis albidis. Horum [Hæc etiæ] alii magis fusci, alii albidiores sunt.

Longitudo totius unc. 1, caudæ 4, corporis 5, Antenn. 4 fere.

Libellæ erumpunt ex crustis seu cute crustacea aureliarum, per fissuram, quæ incipit inter oculos, & continuatur ad radicem rudimentorum alarum; ubi laterali utrinque fissuræ plerunque conjungitur. D. Willughby.

I. *Libella maxima vulgatissima, alis argenteis. Majorum tertia Mouffeti.*  
F. W.

**T**Res ferè uncias longa est; facie virescente, cum macula in summitate nigra. Latera thoracis duæ latæ areæ viridi-flavæ ferè tota occupant; antica pars glauca, duabus areis longis luteis insignis. Dorsum è decem annulis componitur, fusco & viridescenti-albo eleganter varium; per medium linea seu rugula nigra decurrit. Incisuræ nigræ sunt, deinde duæ maculæ majores è viridi albae, & in annularum medio duæ minores. Annuli infimi ferè toti è viridi albican. A cauda appendiculæ seu laminæ nigræ duæ exeunt, à podice subtus utrinque pilus

pilus niger. Oculi pellucidi ; Pedes nigri. Alæ duas uncias longæ, versus summitates maculatæ. Ad fundum seu exortum alarum maculæ minores flavæ. Sub maculis, non procul à macula nigra, cornua duo breviuscula nigra.

2. *Libella maxima, abdomine longo tenuiore, alis fulvescentibus.*

3. *Libella maxima, abdomine longo, tenui, lœvi, viridi-splendente, ad initium & finem intumescente.*

**T**Horax pilis crebris hirtus est, supinè è viridi & cupreo mixto, subtus cupreo colore pilos tralucence splendens. Abdomen longum ut in hoc genere, tenue, laxe, ad exortum à thorace & ad caudam intumescens. Alæ membranaceæ pellucidæ ad exortum luteo tinctæ, dupli in margine exteriore lineola nigra, unâ majore prope extremum, altera transversa minima & vix discernenda circa medium partem notatæ.

4. *Libella maxima, abdomine breviori latiorique flavo.*

*F. W.*

**A**D radicem singularum alarum macula magna è fusco-flavicans, sed major in inferioribus. Ubi alæ corpori adhærent linea albicans in parte inferiore. Alæ reticulatæ & verius extremum malâ fusca notatæ. Scapulæ utrinque areâ latâ, cœruleo-albâ pinguntur.

5. *Libella maxima, abdomine breviori latiorique cœruleo.*

*F. W.*

**M**AS est figuræ latæ. Appendices cauda breviores habet. Ad alarum fundos macula magna fusca, quæ omnes ad corpus lineâ albâ desinunt. Alæ reticulatæ unica tantum macula fusca versus extremum notatæ. Dorsum pulcherrimè cœruleſcit, & ad latera ejus maculæ flavæ.

6. *Libella maxima, abdomine flavo angustiore, nullis ad radices alarum maculis fuscis.*

*F. W.*

**A**LIS est pellucidis. Scapulæ lanugine rufa hirtæ sunt. In anterioribus dorfi annulis par macularum nigricantium : in lateribus scapularum duæ late areæ virides.

7. *Libella major, præcedenti congener, scapulis glabris, alis flavescentibus.*  
F. W.

**P**RÆCEDENTI SIMILLIMA EST, quia maculis magnis fuscis ad radices alarum prorsus caret ut illa, sed differt, 1. Scapulis glabris non hirtis. 2. Quod alæ flavo tingantur, cum in illo prorsus pellucidæ sint. 3. Quod maculae longæ versùs extremitates alarum in hac albidæ sint, in illa nigrae. Dorsum fusco-luteum, lineâ nigrâ per medium decurrente, aliisque utrinque per latera. Per scapulas duæ aliæ latiores albæ, aliæ scapulae glaucae. Latera sub alis albida.

8. *Libella præcedenti congener, scapulis hirtis, alis reticulatis, abdomine pulchre rubente, versùs podicem latiore.*

F. W.

**U**NCIAM  $\frac{1}{2}$  longa est. Scapulae hirtæ sunt, alæ reticulatae, una longa macula fuscâ versùs extremum notatae, ad radices non-nihil flavicantes. Dorsum totum pulchre rubet, & podicem versùs figuræ latioris est. Ultimi annuli superiori parte albicant.

9. *Libella media, corpore partim viridi, partim cœruleo, alis media parte maculis amplissimis è cœruleo nigricantibus [D. Willughby atro-purpureis] oblitis.*

F. W.

**A**LÆ à fundis ad medium ferè lutescunt ; dein macula magna atro-purpurea succedit : extremitates alarum fundis concolores. Scapulae magis virides, dorsum magis cœruleum. Alæ  $\frac{1}{2}$  dig. longæ. Maculis versus extremitates alarum caret.

10. *Libella media, corpore cœruleo, alis ferè totis ex cœruleo nigricantibus.*

**A**PRÆCEDENTE DIFFERT, quod alæ ferè totæ atro-purpureæ sunt, non media parte tantum.

11. *Libella media corpore è viridi cœrulecente, aliis fulvescentibus, absque maculis.*

**H**ÆC maculis prope alas extremas omnino caret, quod paucis communis est.

12. *Libella media*, corpore viridi, alis fulvescentibus [flavescentibus D. Willughby] maculis parvis albis prope extreum angulum.

**V**Enter flavescit. Per scapulas tres linea five rugæ flavicantes ducuntur.

13. *Libella corpore omnino viridi*, & alis etiam, sed leviter. *Mediarum sexta* Mouffeti.

**M**Aculâ fuscâ versùs alarum summitates caret. Alia hujus generis habetur alis & toto corpore viridibus, quæ maculas in alis habet, non tamen fuscas, sed albas.

14. *Libella media*, alis membranacei seu argentei coloris, cum maculis in medio rotundis fuscis.

**M**Aculas habet nigras, in singulis alis singulas versùs extreum.

15. *Libella minor*, alis reticulatis, dorso viridi, incisuris albicantibus.  
F.W.

**L**Ongitudo unciae 1  $\frac{1}{2}$ . Alæ reticulatae, fusco extremis maculatae, cauda breviores. Dorfi annuli 10, virides, incisuris albicantibus. Scapulae viridi purpureo splendent, utrinque linea flavo-viridi comitante. Venter albo-viridis, linea per medium decurrente nigra.

Ex Hexapode aquatiko duplo breviore, pinnulis natatoriis prorsus carente exit.

Quomodo fieri possit ut *Libella* ex verme hexapode duplo breviore producatur, meritò quærerit D. Willughby.

16. *Libella media dorso albido*, duabus maculis nigris juxta incisuras.  
F.W.

**U**Nciam 1  $\frac{1}{2}$  longa est, alis reticulatis, maculâ fuscâ versùs extremitates notatis. Dorsum albidum, duabus parvis maculis nigris juxta incisuras tintatum. In duobus ultimis ad caudam annulis duas longæ maculæ nigræ, lineâ intermediâ cœruleâ.

In paludibus & pratis frequens est.

17. *Libella minor*, alis reticulatis, dorso rubro, maculis ad singulas incisuras nigris.

F. W.

**A**LÆ longiores sunt, réticulatæ, unicâ maculâ fuscâ versùs extremitates notatae. Dorsum 8 annulis constat: coloris rubri est, & ad singulas incisuras maculâ nigrâ infecta. Oculi ex superiori parte rubri ut oculi muscarum, at ex inferiori flavo-virides. Scapulae purpureascunt linea utrinque rubrâ. Nigro-purpurei sunt etiam infimi annuli dorsi. Ventris medium nigrum cum linea utrinque alba.

Hoc genus nascitur ex Hexapode aquatico tribus ad caudam latis pinnulis instructo.

Hujus mas corpore est longo, tenui, è flavo-rubente. Differt à descripta quod corpore sit longiore & tenuiore, quodque in incisuris non maculas ut illa, sed lineas tantum transversas nigras obtineat.

18. *Libella minor*, alis brevioribus, corpore cœruleo, maculis transversis nigris.

F. W.

**H**ÆC cæteris alas breviores habet, tenues, reticulatas, singulas maculâ fuscâ prope extremum notatas. Corporis maxima pars cœrulea cum maculis transversis nigris.

19. *Aliam*, hujus (ut opinabatur) fæminam, quia in coitu inferius adhaerentem vidit, sic describit D. Willughby.

F. W.

**U**nciam 1 1/2 longa erat, areâ nigrâ per totam ventris longitudinem decurrente: Latera ex cœruleo viridescunt; per dorsum etiam area nigra, qua linea albicante dividi videtur. Alæ reticulatæ, caudâ breviores, unâ maculâ fuscâ notatae. Scapulae è fusco nigræ, ad latera tamen viridi-cœruleæ cum duabus lineis nigris.

20. *Libella minor*, alis cauda brevioribus, maculis bicoloribus ex albo & fuso.

**L**ongitudo hujus unciae 1 1/2. Alæ reticulatæ, caudâ breviores, maculis bicoloribus, h.e. una medietate fuscis, altera albis, inscriptis. Dorsum purpuro-nigrum, verum penultimus annulus totus cœruleus. Scapulae è fusco nigræ, ad latera viridi-cœruleæ, cum duabus lineis nigris.

21. *Libel-*

21. *Libella debilis*, tenuis, unciam  $\frac{1}{2}$  longa, alis pellucidis, reticulatis, fuscis maculis notatis.

**S**capulæ rubræ sunt, nigrâ seu purpurascente per medium areâ. Primus annulus à scapulis, & dimidium secundi rubrum, reliquum dorſi purpureum.

22. *Libella minima*, corpore è virideſcente & nigro vario.

23. *Libella minima*, corpore è caruleſcente & nigro vario.

**H**Æ à præcedentibus præterquam quòd minores sint, in eo diſſerunt quòd maculæ in alis vix ſint conſpicuæ, & nervi transverſi pauciores.

*Musca rariſſima in Italia capta, ad Libellas referenda.*

**C**orpus ut in Libellis oblongum eſt: Alæ magnæ, longiſſimæ, ultra corpus extenſæ, reticulatæ, pellucidæ, verū innumeris nigris ſeu fuscis maculis variæ magnitudinis eleganțiſſimè depictæ. Ab oculis ad alarum extrellum  $2\frac{1}{2}$  digitii erant. Alæ inferiores ſuperioribus æquales. In mortuâ alæ non extenſæ erant ſed contractæ ut in Papilioibus. Oculi magni. Ultra oculos & per ſcapulas linea lata nigra decurrit. Spatiū utrinque conterminum luteum eſt. Alæ duæ capitū propius annectuntur.

*Cicada aquatica Mouffeti*, 322.

F.W.

**Q**uia quincuncem in dorso habet huc referenda videtur. Oculi avellanei. Elytra fusca, sed ubi scapulis junguntur duæ latæ lineæ albæ, quarum superior ad aperturam alarum producitur. Scapularum triangulus niger. Posterius par pedum valde longum est ad natandum. Dorsum non latum depresso, sed utrinque ferè in aciem compressum, ad caudam sub elytris & alis tanquam pili.

Proboscide cuti infixâ acrem satis dolorem excitat.

Præcedenti similis. Elytris albis ; scapularum triangulo solo nigro.

Sub elytris albis alæ membranaceæ. Alæ versùs caudam triangularem appendicem habent. Antennis caret. Lingua longior inter pedes reflectitur. Oculi nigri : Alarum primordia alba : Venter planus : Dorsum assurgens : Ultimum par pedum longissimum, quibus ut remis ad natandum utitur.

*Scorpio palustris ad Cimices referendus. Mouffet. 321.*

F.W.

**Q**uincunce ut Cimices in dorso ornatur ; unciam ferè longus est, + latus : Figurâ valde depresso & latâ, caudâ longâ acutâ : Capite parvo. Primum par pedum magnum latum, chelarum instar, unguibus carens, antennarum seu brachiorum vicem supplens : Subtus pectus acutum prominet. Color undique nigricans. Cauda in duos pilos dividitur. Numerus annulorum in ventre ; in ultimo sub pilis anus magnus ; in primo & secundo duo posteriora pedum paria. Pedes 3 habent articulos, duos tenues unguis. Inter chelas caput nigrum, cum duobus oculis nigris. Acuto & in longum protracto ore præditum est : nec antennæ, nec cirri apparent. Alatus est Cimicum modo, alis quincuncem efformantibus.

In rivalis inter saxa later. Alæ quatuor, superiores crassiores, inferiores pellucidae. In dorsum conversus statim brachiis se tollit & revolvit.

*Locustam.*

*Locustam aquaticam Mouffeti*

**H**UC refert D. Willughby, quæ (inquit) propter figuram & longitudinem *Mantis aquatica* dici meretur. Uncias 3; longa est. Cauda 1  $\frac{1}{4}$ ; corpus 1  $\frac{1}{4}$ ; antennæ seu pedes priores  $\frac{1}{4}$ ; pedum ultimum par 1  $\frac{1}{4}$ . Prius par paulò brevius est. Corpore est angusto. Pedes anteriores directè antrorsum antennarum instar extendit, qui sub oculis saepe tanguntur, ut in Scorpione. Ab extremitatibus digiti seu unguis reduplicantur. Inferiùs pectori duo reliqua pedum paria prælonga simul ferè affixa, ut in scorpione, in unguis binos valde tenues desinentia: His repit & natat. Natando prioribus & brevioribus utitur, longioribus & posterioribus se mover, tribus articulis constant. Color fulcus seu sordescens. Oculi parum prominentes. Sub elytris alæ albidiiores tenues cum tinctura levi ruboris. Cauda longa, ex duabus setis constans, ut in Scorpione. Præterea observandum est, pedes in medio articulo sursum esse flexiles, non deorsum; at ubi corpori junguntur deorsum. Lingua acuta inter pedes priores, ut in Scorpione.