

Histoires Naturelles du Grand Père Soulcie

- [Accueil](#) -

Page modifiée le 01 févr. 2004

Mammifères d'Europe (essai de liste)

Quelques notes sur la répartition des espèces les plus localisées sont précisées après leur nom. (F : Les secteurs fréquentés par des espèces très localisées en France sont précisés entre parenthèse).

Marsupiaux

Kangourou de Bennett, *Macropus rufogriseus* (Desmaret, 1817) - Grande Bretagne

Insectivores

Hérisson d'Algérie, *Atelerix algirus* (Lereboullet, 1842) - Canaries, Péninsule ibérique, Malte (F : semble disparu de Provence)

Hérisson oriental, *Erinaceus concolor* Martin, 1838 - Oriental

Hérisson d'Europe, *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758

Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) - Localisé

Musaraigne alpine, *Sorex alpinus* Schinz, 1837 - (F : Alpes du Nord, Jura)

Musaraigne carrelet, *Sorex araneus* Linnaeus, 1758 - (F : Pyrénées, Est de la France, local Massif Central)

Musaraigne masquée, *Sorex caecutiens* Laxmann, 1788 - Scandinavie

Musaraigne couronnée, *Sorex coronatus* Millet, 1828

Musaraigne ibérique, *Sorex granarius* Miller, 1910 - Ouest de la Péninsule ibérique

Musaraigne sombre, *Sorex isodon* Turov, 1924 - Scandinavie

Musaraigne naine, *Sorex minutissimus* Zimmermann, 1780 - Scandinavie

Musaraigne pygmée, *Sorex minutus* Linnaeus, 1766

Sorex raddei Satunin, 1895 - Localisée

Musaraigne des Apennins, *Sorex samniticus* Altobello, 1926 - Italie

Sorex stunini Ognev, 1922 - Localisée

Sorex tundrensis Merriam, 1900 - Localisée

Sorex volnuchini Ognev, 1922 - Localisée

Crossope de Miller, *Neomys anomalus* Cabrera, 1907

Crossope aquatique, *Neomys fodiens* (Pennant, 1771)

Neomys teres Miller, 1908 - Localisé

Crocidure des Canaries, *Crocidura canariensis* Hutterer, Lopez-Jurado & Vogel, 1987 - Canaries

Crocidura gueldenstaedtii (Pallas, 1811) - Localisée

Crocidure leucode, *Crocidura leucodon* (Hermann, 1780)

Crocidure de la Grande Canarie, *Crocidura osorio* Molina & Hutterer, 1989 - Canaries

Crocidure musette, *Crocidura russula* (Hermann, 1780)

Crocidure de Sicile, *Crocidura sicula* Miller, 1900 - Sicile, Malte

Crocidure des jardins, *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811)

Crocidure de Zimmermann, *Crocidura zimmermanni* Wettstein, 1953 - Crête

Pachyure étrusque, *Suncus etruscus* (Savi, 1822) - Méridional (F : Sud)

Desman des Pyrénées, *Galemys pyrenaicus* (E.Geoffroy, 1811) - Pyrénées, nord de la Péninsule ibérique

Desmana moschata (Linnaeus, 1758) - Localisé

Taupe aveugle, *Talpa caeca* Savi, 1822 - Italie, Balkans

Talpa caucasica Satunin, 1908 - Localisée

Taupe d'Europe, *Talpa europaea* Linnaeus, 1758

Talpa levantis Thomas, 1906 - Localisée

Taupe ibérique, *Talpa occidentalis* Cabrera, 1907 - Péninsule ibérique

Taupe romaine, *Talpa romana* Thomas, 1902 - Sud de l'Italie

Taupe des Balkans, *Talpa stankovici* V.Martino & E.Martino, 1931 - Balkans, locale

Chiroptères

Rhinolophe de Blasius, *Rhinolophus blasii* Peters, 1866 - Balkans

Rhinolophe euryale, *Rhinolophus euryale* Blasius, 1853

Grand Rhinolophe, *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774)

Petit Rhinolophe, *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)

Rhinolophe de Mehely, *Rhinolophus mehelyi* Matschie, 1901 - Méridional (F : Sud)

Murin de Bechstein, *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)

Petit Murin, *Myotis blythii* (Tomes, 1857)

Murin de Brandt, *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) - (F : localisé, essentiellement dans l'Est)

Murin de Capaccini, *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837) - Méridional (F : Sud)

Murin des marais, *Myotis dasycneme* (Boie, 1825) - Localisé, centre-nord de l'Europe (F : extrême nord)

Murin de Daubenton, *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)

Murin à oreilles échancrées, *Myotis emarginatus* (E.Geoffroy, 1806)

Grand Murin, *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797)

Murin à moustaches, *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817)

Murin de Natterer, *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl, *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Madère, *Pipistrellus maderensis* (Dobson, 1878) - Canaries

Pipistrelle de Nathusius, *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrelle commune, *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774).

"Splitée" en deux espèce, la Pipistrelle commune, à l'initial et la suivant.

La Pipistrelle commune émet des ultra-sons sur la fréquence de 45 à 48 khz

Pipistrelle soprane, *Pipistrellus pygmaeus* auct. à préciser (décrite dans les années 1990-2000).

Ultra-sons sur la fréquence de 53-56 khz.

Vespère de Savi, *Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837) - Méridional (F : Sud)

Noctule des Açores, *Nyctalus azoreum* (Thomas, 1901) - Açores

Grande Noctule, *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780) - Très sporadique

Noctule de Leisler, *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)

Noctule commune, *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)

Sérotine de Botta, *Eptesicus bottae* (Peters, 1869) - Iles d'Anatolie (Rhodes)

Sérotine de Nilsson, *Eptesicus nilssonii* (Keyserling & Blasius, 1839) - (F : Est du pays)

Sérotine commune, *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
 Sérotine bicolore, *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 - (F : Est du pays)
 Barbastelle d'Europe, *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)
 Oreillard roux, *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)
 Oreillard des Alpes, *Plecotus alpinus* auct. à préciser (décrite dans les années 2001-2002) - Arc alpin (F : Hautes-Alpes)
 Oreillard gris, *Plecotus austriacus* (J.B.Fischer, 1829)
 Oreillard de Ténérife, *Plecotus teneriffae* Barret-Hamilton, 1907 - Canaries
 Minioptère de Schreibers, *Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817)
 Molosse de Cestoni, *Tadarida teniotis* (Rafinesque, 1814) - Méridional (F : Sud)

Primates

Magot, *Macaca sylvanus* (Linnaeus, 1758) - Gibraltar

Lagomorphes

Ochotona alpina (Pallas, 1773) - Localisé
Ochotona pusilla (Pallas, 1769) - Localisé
 Lièvre du Cap, *Lepus capensis* Linnaeus, 1758 - Sardaigne
 Lièvre de Castroviejo, *Lepus castroviejo* Palacios, 1977 - Nord-est de l'Espagne
 Lièvre de Corse, *Lepus corsicanus* De Winton, 1898 - Italie du sud, Sicile, Éteint en Corse
 Lièvre d'Europe, *Lepus europaeus* Pallas, 1778
 Lièvre ibérique, *Lepus granatensis* Rosenhauer, 1856 - Péninsule ibérique, Baléares
 Lièvre variable, *Lepus timidus* Linnaeus, 1758 - Alpes, Scandinavie, Irlande, Ecosse (F : Alpes)
 Lapin de garenne, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758)
 Lapin de Floride, *Sylvilagus floridanus* (J.A.Allen, 1890) - Introduit Italie, semble ne pas s'être acclimaté en France

Rongeurs

Ecureuil de Perse, *Sciurus anomalus* Gldenstaedt, 1785 - Iles de la Mer Ege et vers Istambul
 Ecureuil gris, *Sciurus carolinensis* Gmelin, 1788 - Introduit en Grande Bretagne et Irlande, local en Italie, mais aussi en Suisse
 Ecureuil roux, *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758
 Ecureuil à ventre rouge, *Callosciurus erythraeus* (Pallas, 1779) - Introduit au Cap d'Antibes (F)
 Ecureuil d'Indochine, *Callosciurus finlaysonii* (Horsfield, 1824) - Introduit sur la cte ligure
 Ecureuil de Barbarie, *Atlantoxerus getulus* (Linnaeus, 1758) - Canaries (introduit)
 Marmotte des Alpes, *Marmota marmota* (Linnaeus, 1758) - Alpes, introduit Pyrnes, etc. (F)
Marmota bobak Mller, 1776 - Localise
 Souslik d'Europe, *Spermophilus citellus* (Linnaeus, 1766) - Steppes de l'Europe orientale
Spermophilus fulvus (Lichtenstein, 1823) - Localise
Spermophilus major (Pallas, 1778) - Localise
Spermophilus musicus Mntries, 1832 - Localise

Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778) - Localisé
 Souslik tâcheté, *Spermophilus suslicus* (Güldenstaedt, 1770) - Est de la Pologne
 Tamias de Sibérie, *Tamias sibiricus* (Laxmann, 1769) - Introduit çà et là
 Polatouche, *Pteromys volans* (Linnaeus, 1758) - Finlande, nord des Pays Baltes
 Castor du Canada, *Castor canadensis* Kuhl, 1820 - Introduit Finlande
 Castor d'Europe, *Castor fiber* Linnaeus, 1758 - (F : Local sur les grands fleuves, sauf la Seine)
 Hamster commun, *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758) - (F : Alsace)
Allocricetulus evermanni (Brandt, 1859) - Localisé
 Hamster migrateur, *Cricetulus migratorius* (Pallas, 1773) - Extrême est de l'Europe, Grèce
 Hamster de Newton, *Mesocricetus newtoni* (Nehring, 1898) - Local en Roumanie et Bulgarie
Mesocricetus raddei (Nehring, 1894) - Localisé
Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1778) - Localisé
 Lemming de forêt, *Myopus schisticolor* (Lilljeborg, 1844) - Scandinavie sauf Danemark et essentiel de la Norvège
 Lemming des toundra, *Lemmus lemmus* (Linnaeus, 1758) - Scandinavie sauf Danemark et essentiel de la Suède
Lemmus sibiricus (Kerr, 1792) - Localisé
 Campagnol roussâtre, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780)
 Campagnol de Sundevall, *Clethrionomys rufocanus* (Sundevall, 1846) - Scandinavie sauf Danemark et essentiel de la Finlande
 Campagnol boréal, *Clethrionomys rutilus* (Pallas, 1779) - Nord de la Scandinavie
 Campagnol de Martino, *Dinaromys bogdanovi* (Martino, 1922) - Dalmatie
 Campagnol amphibie, *Arvicola sapidus* Miller, 1908 - Franco-ibérique
 Campagnol terrestre, *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758)
 Rat musqué, *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)
 Campagnol agreste, *Microtus agrestis* (Linnaeus, 1761)
 Campagnol des champs, *Microtus arvalis* (Pallas, 1778)
 Campagnol de Cabrera, *Microtus cabrerae* Thomas, 1906 - Péninsule ibérique
Microtus daghestanicus (Shidlovskii, 1919) - Localisé
 Campagnol provençal, *Microtus duodecimcostatus* De Selys-Longchamps, 1839 - Méridional franco-ibérique (F : Sud)
Microtus gregalis (Pallas, 1779) - Localisé
 Campagnol de Felten, *Microtus felteni* Malec & Storch, 1963 - Balkans, local
 Campagnol des Pyrénées, *Microtus gerbei* (Gerbe, 1879) - France occidentale, Pyrénées (F)
 Campagnol méditerranéen, *Microtus guentheri* (Danford & Alston, 1880) - Balkans
 Campagnol basque, *Microtus lusitanicus* (Gerbe, 1879) - Péninsule ibérique (F : Pays Basque)
Microtus majori Thomas, 1906 - Localisé
 Campagnol de Fatio, *Microtus multiplex* (Fatio, 1905) - Sud des Alpes, Vallée du Rhône, Nord de l'Italie et de la Dalmatie (F)

Microtus obscurus (Eversmann, 1841) - Localisé
 Campagnol nordique, *Microtus oeconomus* (Pallas, 1776) - Nord de l'Europe, au centre en Hongrie et environs
 Campagnol d'Ondrias, *Microtus rossiarmeridionalis* Ognev, 1924 - Oriental (Pays Baltes, Finlande, Balkans)
 Campagnol de Savi, *Microtus savii* De Sélys-Longchamps, 1838 - Italie, Sicile (F : Alpes orientales)
Microtus socialis (Pallas, 1773) - Localisé
 Campagnol souterrain, *Microtus subterraneus* De Sélys-Longchamps, 1836
 Campagnol des Tatras, *Microtus tatricus* Kratochvil, 1952 - Carpathes
 Campagnol de Thomas, *Microtus thomasi* (Barret-Hamilton, 1903) - Balkans
Chionomys gud (Satunin, 1909) - Localisé
 Campagnol des neiges, *Chionomys nivalis* (Martins, 1842) - (F : Alpes, Pyrénées, Massif Central...)
Chionomys roberti (Thomas, 1906) - Localisé
Lagurus lagurus (Pallas, 1773) - Localisé
Prometheomys schaposchnikowi Satunin, 1901 - Localisé
Ellobius talpinus (Pallas, 1770) - Localisé
Meriones meridianus (Pallas, 1773) - Localisé
Meriones tamariscinus (Pallas, 1773) - Localisé
 Mérione de Tristram, *Meriones tristrami* Thomas, 1802 - Iles de la Mer Egée
Spalax arenarius Reshetnik, 1939 - Localisé
Spalax gignateus Nehring, 1898 - Localisé
 Spalax de Bukovine, *Spalax graecus* Nehring, 1898 - Roumanie
Spalax microphthalmus Gldenstaedt, 1770 - Localisé
Spalax zemni Erxleben, 1777 - Localisé
 Spalax occidental, *Nannospalax leucodon* (Nordmann, 1840) - Balkans, Hongrie, Roumanie
 Rat des moissons, *Micromys minutus* (Pallas, 1771)
 Mulot rayé, *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771) - Oriental
 Mulot alpestre, *Apodemus alpicola* Heinrich, 1952 - Alpes (F : Haute-Savoie, Tende)
 Mulot à collier, *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834)
Apodemus fulvipectus Ognev, 1924 - Localisé
 Mulot rupestre, *Apodemus mystacinus* (Danford & Alston, 1877) - Dalmatie, Balkans
Apodemus ponticus Sviridenko, 1936 - Localisé
 Mulot sylvestre, *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1758)
 Mulot pygmée, *Apodemus uralensis* (Pallas, 1811) - Oriental
 Rat surmulot, *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)
 Rat noir, *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758)
 Souris domestique, *Mus domesticus* Schwarz & Schwarz, 1943
 Souris de Macédoine, *Mus macedonicus* Petrov & Ruzic, 1983 - Balkans
 Souris grise, *Mus musculus* Linnaeus, 1758 - Oriental (NB : absente de F)
 Souris des steppes, *Mus spicilegus* Petényi, 1882 - Orientale
 Souris d'Afrique du Nord, *Mus spretus* Lataste, 1883 - Franco-ibérique méridionale (F : Sud)
 Rat épineux de Crête, *Avcomys minous* Bate, 1906 - Crête
 Loir gris, *Glis glis* (Linnaeus, 1766)

Muscardin, *Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758)
 Lérot, *Eliomys quercinus* (Linnaeus, 1766)
 Lérotin, *Dryomys nitedula* (Pallas, 1778) - Oriental
 Loir d'Ognev, *Myomimus roachi* (Bate, 1937) - Vers la Turquie européenne
 Siciste des bouleaux, *Sicista betulina* (Pallas, 1779) - Orientale
Sicista caucasica Vinogradov, 1925 - Localisée
Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich & Kovalskaya, 1986 - Localisée
Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya & Baskevich, 1980 - Localisée
Sicista severtzovi Ognev, 1935 - Localisée
Sicista strandi (Formozov, 1931) - Localisée
 Siciste des steppes, *Sicista subtilis* (Pallas, 1773) - Très locale, orientale
Dipus sagitta (Pallas, 1773) - Localisé
Stylodipus telum (Lichtenstein, 1823) - Localisé
Allactaga elater (Lichtenstein, 1828) - Localisé
Alactaga major (Kerr, 1792) - Localisé
Pygeretmus pumilio (Kerr, 1792) - Localisé
 Porc-épic à crête, *Hystrix cristata* Linnaeus, 1758 - Italie, Sicile
 Ragondin, *Myocastor coypus* (Molina, 1782)

Cétacés (pas de localisation saisie pour l'instant) - [Quelques liens sur les Mammifères marins d'Europe](#)

Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)
Monodon monoceros Linnaeus, 1758
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
Steno bredanensis (Lesson, 1828)
Delphinus delphis Linnaeus, 1758
Sousa teuszii (Kükenthal, 1892)
Stenella attenuata (Gray, 1846)
Stenella clymene (Gray, 1846)
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Stenella frontalis (G.Cuvier, 1829)
Lagenodelphis hosei Fraser, 1956
Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)
Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Gramphus griseus (G.Cuvier, 1812)
Globicephala melas (Traill, 1809)
Globicephala macrorhynchus Gray, 1846
Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
Pseudorca crassidens (Owen, 1846)
Feresa attenuata Gray, 1875
Peponocephala electra (Gray, 1846)
Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)
Ziphius cavirostris G.Cuvier, 1823
Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)
Mesoplodon densirostris (Blainville, 1817)
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)
Mesoplodon grayi Von Haast, 1876
Mesoplodon mirus True, 1913
Kogia breviceps (Blainville, 1838)

Kogia simus (Owen, 1866)
Physiter catodon Linnaeus, 1758
Eubalaena glacialis (Müller, 1776)
Balaena mysticetus Linnaeus, 1758
Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804
Balaenoptera borealis Lesson, 1828
Balaenoptera edeni Anderson, 1879
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

Carnivores

Chacal doré, *Canis aureus* Linnaeus, 1758
Loup, *Canis lupus* Linnaeus, 1758 - (F : Alpes)
Renard polaire, *Alopex lagopus* (Linnaeus, 1758) - Nord-est de la Scandinavie, Islande, Iles arctiques
Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) - Localisé
Renard roux, *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)
Chien viverrin, *Nyctereutes procyonoides* (Gray, 1834) - Centre-oriental, Balkans (F : Alsace ?)
Ours brun, *Ursus arctos* Linnaeus, 1758 - Oriental, Pyrénées, Monts cantabriques, Abruzzes, Scandinavie, Pays Baltes (F : Pyrénées)
Ours blanc, *Ursus maritimus* Phipps, 1774 - Iles arctiques, absent d'Islande
Raton laveur, *Procyon lotor* (Linnaeus, 1758) - Europe centrale (F : Nord-est)
Hermine, *Mustella erminea* Linnaeus, 1758
Putois des steppes, *Mustella eversmanii* Lesson, 1827 - Oriental
Vison d'Europe, *Mustella lutreola* (Linnaeus, 1761) - Ouest de la France, Pays Basque, Pays Baltes et delta du Danube (F)
Belette d'Europe, *Mustella nivalis* Linnaeus, 1766
Putois d'Europe, *Mustella putorius* Linnaeus, 1758
Mustella sibirica Pallas, 1773 - Localisée
Vison d'Amérique, *Mustella vison* Schreber, 1777 - Dispersé, sauf Nord de l'Europe (F : Bretagne)
Putois marbré, *Vormela pergusna* (Güldenstaedt, 1770) - Balkans
Fouine, *Martes foina* (Erxleben, 1777)
Martre des pins, *Martes martes* (Linnaeus, 1758)
Martes zibellina (Linnaeus, 1758) - Localisée
Glouton, *Gulo gulo* (Linnaeus, 1758) - Nord de la Scandinavie
Blaireau européen, *Meles meles* (Linnaeus, 1758)
Loutre d'Europe, *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758) - (F : Ouest, relictuelle ailleurs)
Genette commune, *Genetta genetta* (Linnaeus, 1758) - Franco-ibérique (F : plutôt ouest du Rhône et sud de la Loire)
Petite Mangouste indienne, *Herpestes auropunctatus* Hodgson, 1836 - Introduite en Dalmatie
Mangouste ichneumon, *Herpestes ichneumon* (Linnaeus, 1758) - Sud de la Péninsule ibérique
Felis chaus Schreber, 1777 - Localisé
Chat sauvage, *Felis silvestris* Schreber, 1775 - (F : Plutôt Nord-est)
Lynx boréal, *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758) - Oriental (F : Jura, Alpes, disparu des Pyrénées ?)

- Lynx pardelle, *Lynx pardinus* (Temminck, 1827) - Péninsule ibérique
- Pinnipèdes - [Quelques liens sur les Mammifères marins d'Europe](#)**
- Morse, *Odobenus rosmarus* (Linnaeus, 1758) - Côte norvégienne, îles arctiques
- Phoque caspique, *Phoca caspica* Gmelin, 1788 - Localisé
- Phoque du Groënland, *Phoca groenlandica* Erxleben, 1777 - Côte norvégienne, îles arctiques
- Phoque annelé, *Phoca hispida* Schreber, 1775 - Côtes de la Baltique
- Phoque veau-marin, *Phoca vitulina* Linnaeus, 1758 - Côtes de la Manche, de la Mer du Nord et localement de la Baltique, Islande
- Phoque gris, *Halichoerus gryphus* (Fabricius, 1791) - Côtes de la Manche, de la Mer du Nord, de la Baltique, Islande
- Phoque barbu, *Erignathus barbatus* (Erxleben, 1777) - Îles arctiques
- Phoque moine, *Monachus monachus* (Hermann, 1779) - Côte grecque, localement Mer noire, Dalmatie et Sardaigne, Canaries
- Phoque à capuchon, *Cystophora cristata* (Erxleben, 1777) - Islande, îles arctiques

Ongulés

- Sanglier, *Sus scrofa* Linnaeus, 1758
- Muntjac de Chine, *Muntiacus reevesi* (Ogilby, 1839) - Angleterre
- Cerf axis, *Axis axis* (Erxleben, 1777) - Istrie
- Daim européen, *Dama dama* (Linnaeus, 1758)
- Cerf élaphe, *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758
- Cerf sika, *Cervus nippon* Temminck, 1838 - Disséminé, introduit (F : Provence, Bassin parisien)
- Chevreuil de Virginie, *Odocoileus virginianus* (Zimmermann, 1780) - Introduit, Finlande, Tchèque...
- Elan, *Alces alces* (Linnaeus, 1758) - Scandinavie, Pologne, localement plus au sud
- Renne, *Rangifer tarandus* (Linnaeus, 1758) - Norvège, Finlande, Islande, Svalbard
- Hydropote chonois, *Hydropotes inermis* Swinhoe, 1870 - SE de l'Angleterre (F : local)
- Chevreuil européen, *Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758)
- Capreolus pygargus* (Pallas, 1771) - Localisé
- Bison d'Europe, *Bison bonasus* (Linnaeus, 1758) - Pologne, Pays Baltes, Roumanie
- Saiga tatarica* (Linnaeus, 1766) - Localisée
- Isard, *Rupicapra pyrenaica* Bonaparte, 1845 - Pyrénées, Monts Cantabriques, Abruzzes
- Chamois, *Rupicapra rupicapra* (Linnaeus, 1758) - Ensemble de l'Arc alpin jusqu'aux Balkans (F)
- Bœuf musqué, *Ovibos moschatus* (Zimmermann, 1780) - Norvège, Introduit
- Chèvre égagre, *Capra aegragrus* Erxleben, 1777 - Grèce et îles grecques
- Capra caucasica* Gùldenstaedt & Pallas, 1783 - Localisée
- Capra cylindricornis* (Blyth, 1841) - Localisée
- Bouquetin des Alpes, *Capra ibex* Linnaeus, 1758 - Alpes (F)
- Bouquetin des Pyrénées, *Capra pyrenaica* Schinz, 1838 - Péninsule ibérique (F : disparu)

Mouflon à manchettes, *Ammotragus lervia* (Pallas, 1777) - Introduit localement

Mouflon méditerranéen, *Ovis ammon* (Linnaeus, 1758) - Dispersé en divers points du continent (F : Alpes, Massif Central, Pyrénées, Pas de Calais)

Cheval Potok, *Equus caballus* - Serait une population relique du Pléistocène dans le Pays-Basque (à confirmer)

Histoires Naturelles du Grand Père Soulcie